

# **ARES SARDEGNA**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
a tempo indeterminato di n. 57 posti di  
Operatore Socio Sanitario, Cat. BS**

**SESSIONE 2 - PROVA 01**



- 
- 1 D00001
- In caso di assistenza a una persona che vomita, l'OSS deve:**
- A** rilevare quantità e aspetto del vomito e riferire all'infermiere
  - B** somministrare farmaci antiemetici
  - C** far assumere prontamente la posizione supina
  - D** far assumere prontamente la posizione prona
- 
- 2 D00002
- Secondo le ultime linee dell'Italian Resuscitation Council (IRC) e dell'European Resuscitation Council – BLS-D del 2021, il rapporto compressioni-ventilazioni è pari a:**
- A** 30:02
  - B** 15:02
  - C** 10:02
  - D** 30:04
- 
- 3 D00003
- Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:**
- A** nuca, sacro, scapole, talloni
  - B** sacro, ginocchio, scapole
  - C** orecchio, sacro, ginocchio
  - D** malleolo, gomito, orecchio
- 
- 4 D00004
- Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:**
- A** tosse
  - B** tachicardia
  - C** ipotensione
  - D** eritema
- 
- 5 D00005
- Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?**
- A** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
  - B** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
  - C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
  - D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo
- 
- 6 D00006
- Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?**
- A** Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
  - B** Scelta della dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
  - C** Medicazione dell'ano artificiale con apposite creme antibiotiche
  - D** Esecuzione dell'irrigazione
-

- 
- 7 D00007
- In caso sia necessario effettuare la rianimazione cardiopolmonare, si deve innanzitutto:**
- A** assicurare la pervietà delle vie aeree
  - B** garantire la circolazione sanguigna
  - C** predisporre il materiale per il posizionamento di un accesso venoso
  - D** somministrare ossigeno ad alti flussi
- 
- 8 D00008
- Prima di eseguire il bagno a letto a un paziente ipoacusico, che cosa deve fare l'operatore sociosanitario?**
- A** Accertarsi che la persona abbia compreso l'attività che si sta per svolgere
  - B** Posizionare le spondine per evitare cadute accidentali, in quanto ipoacusico e a maggior rischio di cadute
  - C** Non posizionare la protesi acustica in quanto potrebbe danneggiarsi con l'acqua
  - D** Non posizionare la protesi acustica in quanto potrebbe danneggiarsi con l'acqua; di conseguenza occorre parlare in modo pacato affinché il paziente legga il labiale
- 
- 9 D00009
- Rispetto all'uso della carrozzina come ausilio alla mobilitazione, la caratteristica corretta che l'operatore sociosanitario deve verificare è che:**
- A** le ruote siano gonfie e munite di freni facilmente azionabili
  - B** i poggipiedi siano fissi e non removibili
  - C** lo schienale sia ergonomico, comodo e ingombrante
  - D** i braccioli siano fissi e non removibili
- 
- 10 D00010
- Per prevenire l'infezione alle vie urinarie in un paziente portatore di catetere vescicale:**
- A** è necessario evitare di collocare il sacchetto di raccolta a contatto col pavimento
  - B** è necessario collocare il sacchetto di raccolta almeno 40 cm più in alto rispetto al livello della vescica
  - C** è possibile utilizzare lo stesso sacchetto su pazienti diversi, previa opportuna sanificazione
  - D** è indicato l'uso della sola acqua per l'esecuzione delle cure igieniche perineali
- 
- 11 D00011
- Per riposizionare un paziente che è scivolato verso i piedi del letto, quale azione gli operatori sociosanitari devono compiere, nella manovra a due operatori, per evitare traumi alla propria colonna vertebrale?**
- A** Appoggiarsi con un ginocchio sul letto per avere una leva favorevole
  - B** Mantenere una base d'appoggio stretta
  - C** Flettere la schiena in avanti verso il piano del letto
  - D** Mantenere il piano di appoggio basso con la testata del letto elevata di 30° rispetto al piano
- 
- 12 D00012
- In quale sequenza vanno ricercati i segni vitali?**
- A** Stato di coscienza – attività respiratoria – attività cardiaca
  - B** Attività cardiaca – attività respiratoria – stato di coscienza
  - C** Stato di coscienza – attività cardiaca – attività respiratoria
  - D** Attività respiratoria – attività cardiaca – stato di coscienza
-

- 
- 13 D00013
- Durante l'effettuazione di una medicazione:**
- A** è opportuno che nella stanza non si effettuino altre attività
  - B** è opportuno che nella stanza non si effettuino contemporaneamente attività di rifacimento del letto
  - C** è influente che nella stanza si effettuino contemporaneamente altre attività
  - D** è opportuno che nella stanza non si effettuino contemporaneamente attività di pulizia
- 
- 14 D00014
- Nell'assistenza post-operatoria l'OSS deve:**
- A** su indicazione del personale medico o infermieristico, accompagnare in reparto il paziente in barella con la documentazione relativa all'intervento subito
  - B** intervenire in autonomia in caso di complicanze dell'anestesia
  - C** informare la famiglia riguardo all'esecuzione dell'intervento e all'esito dello stesso
  - D** osservare il paziente fino al suo risveglio
- 
- 15 D00015
- Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**
- A** prima e dopo averli indossati
  - B** solo prima di indossarli
  - C** solo quando evidentemente contaminate
  - D** solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici
- 
- 16 D00016
- Se il paziente vomita è necessario:**
- A** fargli assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale
  - B** fargli assumere sempre la posizione seduta
  - C** aspettare che si senta meglio prima di muoverlo
  - D** fargli assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale
- 
- 17 D00017
- Algoritmo BLS-D: dopo aver accertato che la vittima non risponde e non respira normalmente, individuare la sequenza corretta.**
- A** Chiamare il 118/112; eseguire 30 compressioni toraciche; eseguire 2 ventilazioni; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni
  - B** Eseguire 10 compressioni toraciche; eseguire 2 ventilazioni; chiamare il 118/112; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni; continuare RCP 30:2
  - C** Eseguire 2 ventilazioni; eseguire 30 compressioni toraciche; chiamare il 118/112; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni
  - D** Chiamare il 118/112; eseguire 5 ventilazioni; eseguire 30 compressioni toraciche; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni
- 
- 18 D00018
- L'operatore sociosanitario non può:**
- A** eseguire medicazioni complesse
  - B** eseguire medicazioni semplici
  - C** aiutare il paziente ad assumere il cibo
  - D** sanificare una stanza di degenza
-

